

INFORMARE PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

- Să nu achiziționeze și să nu vândă animale neidentificate, fără documente de mișcare, fără certificat sanitar-veterinar pentru porcine respectiv pentru animalele destinate abatorizării, eliberat de medicul veterinar;
- Să nu scoată/introducă scroafe/vieri din/în exploatație în vederea efectuării monei;
- Să nu sacrifice porci aflați în gospodăriile populației aflate în zona de supraveghere și protecție fără avizul medicului veterinar;
- Să anunțe orice caz suspect (animal mort sau cu semne clinice) medicului veterinar;
- Să folosească echipamente de protecție (salopetă, cisme de cauciuc) numai în adăpostul animalelor/porcilor;
- Să utilizeze dezinfectanți pentru încălțăminte folosită, la intrarea și ieșirea din adăpostul animalelor/porcilor; în acest sens se vor amenaja dezinfectoare pietonale la intrarea în adăpost;
- Să nu hrănească porcii cu resturi alimentare de la bucătărie (lături-resturi de la carne și produse din carne de porc/mistreț, în special nepreparate termic);
- Să evite intrarea în adăpostul porcilor, timp de 48 ore, în cazul în care participă la activități de vânatoare;
- Să evite contactul direct sau indirect cu mistreții/mediul silvatic;
- Să evite accesul persoanelor străine, nejustificat, în adăpostul animalelor;
- Să folosească în hrana porcilor nutrețurile vegetale numai după minim 30 de zile de la recoltarea acestora;
- Să folosească paie, ca așternut, după minim 90 de zile de zile de la recoltarea acestora;
- Să igienizeze și să dezinfecteze orice echipament pe care îl folosesc..
- Să schimbe îmbracaminte și încălțăminte la întoarcerea de la activitățile agricole care sunt efectuate în această perioadă;
- Să schimbe îmbracaminte și încălțăminte la întoarcerea de la activitățile forestiere care sunt efectuate în această perioadă;

Crescătorii de porci sunt despăgubiți pentru pierderile de animale cauzate de boală

Beneficiază de despăgubiri:

- Proprietarii de animale sacrificate sau ucise, cu scopul eliminării rapide a focarelor PPA.

Pentru informații, contactați medicul veterinar!

Despăgubirea se va face la prețul pieței.

Conform H.G.830/2016 și H.G.1156/2013 se acordă recompense persoanelor care contribuie la stoparea extinderii virusului pestei porcine africane astfel:

- 225 LEI - pentru fiecare porc mistreț găsit mort sau bolnav și împușcat ulterior (de persoanele implicate în managementul silvic sau forestier și vânătorii).
- 65 LEI - pentru fiecare porc mistreț mascul vânat din zonele de mare risc.
 - 400 LEI - pentru fiecare femelă vânată din zonele de mare risc.
- 65 LEI - pentru fiecare cadavru de porc domestic găsit sau pentru fiecare porc care prezintă semne de boală.

Campanie de informare susținută de:




APCPR

AMVS (Asociația Medicilor Veterinari pentru Suine)



INFORMARE PESTA PORCINĂ AFRICANĂ (PPA)

Fii informat! Fii responsabil!



Ce este Pesta Porcină Africană (PPA)?

O boală infecțioasă, extrem de contagioasă, FĂRĂ tratament sau vaccin, care afectează porcii domestici și mistreții.

Boala provoacă moartea tuturor animalelor infectate.

BOALA NU SE TRANSMITE LA OM ȘI NU

ÎI AFECTEAZĂ STAREA DE SĂNĂTATE!





ATENȚIE GOSPODARI !!!

Probleme care pot să apară din cauza cărnii provenite de la porci sacrificați pentru consum, în localitățile în care a fost depistată

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

- Prin prepararea termică a cărnii în gospodărie, virusul Pestei Porcine Africane **NU SE DISTRUGE**;
- Carnea **CONGELATĂ** - poate transmite boala ANI de zile;
- **SĂRAREA, AFUMAREA ȘI CONDIMENTAREA** - nu distrug virusul Pestei Porcine Africane ;
- **SUBPRODUSELE ȘI LĂTURILE** rezultate în urma preparării cărnii în gospodărie – cresc pericolul transmiterii bolii prin utilizarea lor în hrana porcilor;
- Carnea **VÂNDUTĂ** sau dată rudelor sau prietenilor - transmite boala la porcii din alte localități;

Păstrarea cărnii potențial infectate face posibilă oricând
REAPARIȚIA bolii în gospodărie

IMPLICĂ-TE ȘI TU!

PROTEJEAZĂ-ȚI ANIMALELE!

Cum recunoști un animal bolnav?

1. Febră (peste 40 de grade Celsius);
2. Nu mănâncă;
3. Este abătut;
4. Are pielea înroșită (urechi, cap, burtă, picioare);
5. Conjunctivită; diaree cu sânge.

Boala se transmite prin:

- Contactul animalelor sănătoase cu cele bolnave;
- Contactul omului cu animalele bolnave și apoi cu animalele sănătoase;
- Sângele, țesuturile, excrețiile și secrețiile provenite de la animalele bolnave;
- Furaje, echipamente, vehicule, păsări, rozătoare, insecte, persoane **CONTAMINATE**;
- Hrănirea porcilor cu resturi alimentare **CONTAMINATE**.

Pentru a vă **PROTEJA** porcii, respectați următoarele:

1. **CREȘTEȚI** porcii doar în adăposturi îngrădite, pentru a elimina contactul lor cu alți porci sau mistreți!
2. În adăposturile porcilor purtați haine și încălțăminte destinate acestui scop!
3. **PREVENIȚI ACCESUL** păsărilor sau a rozătoarelor în adăpost!
4. **NU** hrăniți porcii cu resturi alimentare sau cu furaje din zonele afectate!
5. **NU** cumpărați animale din surse neautorizate!
6. **EVITAȚI** contactul cu porcii din alte gospodării, chiar dacă par sănătoși!
7. **VERIFICAȚI** zilnic starea de sănătate a porcilor!
8. **ANUNȚAȚI** medicului veterinar orice suspiciune!

NU SACRIFICAȚI PENTRU

CONSUM ANIMALELE BOLNAVE!

